

Handläggare:

Maria Ajne

Håkan Wramner

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om provtagning för Mykoplasma Genitalium vid STI-provtagning

Ärendet

I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Dag Larsson (S) att förvaltningen ska utreda huruvida mykoplasma genitalium kan testas i samband med andra STI-test.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens synpunkter

Mykoplasma genitalium är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av en bakterie som likt klamydia ger en infektion i urinrör och livmoderhals. Infektionen behandlas med antibiotika. Provtagning kan tas först en vecka efter infektion och sker genom urinprov för både män och kvinnor. Infektionen har varit känd sedan början av 1980-talet, men provtagning har varit möjlig först sedan år 2002.

Mykoplasma genitalium är relativt vanlig, men då infektionen ofta inte ger några symptom kan den därför förbli oupptäckt.

Det är oklart om Mykoplasma genitalium kan orsaka sterilitet eller utomkvedshavandeskap, men kan troligtvis orsaka genital infektion d.v.s. äggledareinfektion och bitestikelfektion.

Mykoplasma genitalium faller inte under smittskyddslagen men Smittskyddsinstitutet rekommenderar dock att kontaktsparning ska utföras fast att infektionen inte är anmälningspliktig.

Den gängse rutinen är att testa för mykoplasma genitalium först då klamydiaprov visat negativt men symptomen kvarstår.

Möjlighet till provtagning av mykoplasma genitalium finns idag såväl inom ramen för laboratorietjänster för öppenvårdsremittenter, som för provtagning inom sjukhusverksamheten. Analysen (beteckning NPU 21763) är upphandlad och kostnaden för denna analys är mellan 358 kr och 424 kr.

Catarina Andersson Forsman

Olle Olofsson

Provtagning för Mykoplasma Genitalium vid STI- provtagning


Det finns en sexuellt överförbar sjukdom vid namn mykoplasma genitalium, vars symtom liknar eller desamma som klamydia, men som inte per automatik ingår i de tester som genomförs vid sedvanlig provtagning. Anledningen kan vara att smittspårning av denna åkomma inte regleras i smittskyddslagen.

Då klamydia och mykoplasma genitalium kräver olika typer av antibiotika tror patienten att den är smittfri men sprider i verkligheten smittan vidare. Därför bör möjligheten att vid klamydiatest även testa för mykoplasma genitalium.

Med anledning av ovanstående föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att utreda huruvida mykoplasma genitalium kan testas i samband med andra STI-test.

Stockholm 2010-01-26


Dag Larsson (s)